

Chers parents,

Dans le groupe/classe de votre enfant, la présence de poux de tête a été détectée. Les enfants concernés sont exclus de la fréquentation de l'établissement jusqu'à ce que le risque d'une continuation de la propagation n'existe plus. La présence de poux de tête n'est pas synonyme de mauvaise hygiène personnelle. La propagation des poux se fait plutôt par contacts personnels, de „cheveux à cheveux“, principalement dans les établissements collectifs pour enfants et adolescents.

Vérification de la présence de poux de tête

Vérifiez le cuir chevelu de votre enfant à la recherche de poux et oeufs (lentes).

- Appliquez un après-shampooing sur les cheveux bien mouillés et épouillez les cheveux avec un peigne normal.
- Peignez les cheveux mèche par mèche de la racine à la pointe des cheveux à l'aide d'un peigne à poux.
- Après chaque coup de peigne, il faut nettoyer le peigne à plusieurs reprises sur un tissu clair ou sur un papier de cuisine jusqu'à ce qu'il n'y ait plus ni poux ni lentes.
- Après avoir passé tous les cheveux, il faut rincer rigoureusement le reste de l'après-shampooing et laissez les cheveux complètement mouillés.
- Epouillez les cheveux avec un peigne normal.
- Si vous détectez des poux et/ou des lentes, vérifiez les têtes de tous les autres membres de famille et entreprenez sans délai le traitement des personnes infestées.

Les lentes se retrouvent attachées sur la tige du cheveu et elles sont de couleur blanche à brunâtre. Elles sont le plus facilement à détecter derrière les oreilles, sur les tempes et sur la nuque. Elles ont la taille d'un grain de sable et ne sont pas facile à voir aux yeux nus.

On confond les lentes souvent avec des pellicules. Toutefois, celles-ci ne sont pas collées aux cheveux comme les lentes, mais ils sont facilement à enlever et ils ont une forme irrégulière. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez donc utiliser une loupe pour les chercher.

Les poux de tête peuvent être difficiles à apercevoir. Ils fuient la lumière et ils disparaissent tout de suite dans l'obscurité. Le pou adulte est environ de la taille d'une graine de sésame.

Traitement des poux de tête

Si vous constatez à ces examens de contrôle de votre enfant la présence de poux et/ou de lentes, vous devez entreprendre le traitement des poux avec un produit anti-poux autorisé. Une fois le traitement effectué, il faut peigner les cheveux mouillés en appliquant un après-shampooing et un utilisant un peigne conçu pour les poux de la façon suivante :

Jour 1:

- Veuillez lire attentivement la notice d'emballage du produit anti-poux et suivre exactement le mode d'emploi (ingrédients autorisés dans le produits anti-poux: perméthrine, pyrèthre et alléthrine). Les possibles causes d'échec du traitement des pédiculoses, favorisant la survie des poux et des lentes, sont les suivantes :
 - Durée insuffisante des applications
 - Application d'une quantité insuffisante du produit
 - Application trop irrégulière du produit
 - Dilution trop forte du produit dans les cheveux
 - Omettre de répéter le traitement
- Passé le temps d'action nécessaire, il faut rincer les cheveux avec de l'eau chaude.
- Appliquez généreusement un après-shampooing courant sur les cheveux bien mouillés. Peignez les cheveux rigoureusement mèche par mèche de la racine à la pointe des cheveux à l'aide d'un peigne à poux. Nettoyez le peigne sur un tissu ou sur un papier de cuisine.

Jour 5 Répéter la méthode de peignage avec le peigne anti-poux et après-shampooing conformément aux indications dessus afin d'éliminer toutes les nouvelles lentes écloses avant qu'elles ne viennent à maturité.

Jour 9: Traitement avec produit anti-poux et „peignage des cheveux mouillés“ avec peigne anti-poux et après-shampooing afin de tuer les lentes fraîchement écloses conformément à la description du jour 1.

Jour 13: Nouveau examen de contrôle en utilisant l'après-shampooing conformément au jour 5.

Jour 17: Dernier contrôle avec peigne anti-poux et après-shampooing conformément au jour 5.

Mesures additionnelles

- Lavez rigoureusement les peignes et les brosses à cheveux dans de l'eau chaude avec du savon (au mieux en utilisant une brosse à ongles).
- Changez les serviettes de toilette, linges de corps, literie ainsi que les pyjamas et lavez à une température de 60° C au minimum.
- Les chapeaux, les foulards, les oreillers et les animaux en peluche doivent être lavés à une température de 60° C ou mises pendant trois jours dans un sac de plastic hermétiquement fermé ou conservées pendant deux jours à une température inférieure à -10° C (afin de tuer les lentes, il faut les conserver pendant deux semaines dans un sac de plastic).
- Vérifiez la tête de tous les membres de la famille et initiez éventuellement le traitement.
- N'utilisez pas de produits désinfectants ou des insecticides.

Veillez s'il vous plaît remplir et signer la confirmation parentale que vous trouverez en annexe. Présentez le document auprès de votre établissement collectif pour la

réadmission de votre enfant. Si vous avez d'autres questions, nous sommes à votre disposition sous le numéro de téléphone 06151/3309-0.
Veuillez agréer, chers parents, mes salutations distinguées
Votre service de santé publique